

# Grauwe vliegenvanger

## Uitzicht

De Grauwe liegenvanger (*Muscipapa striata*) is onopvallend. Iets kleiner en vooral slanker dan de huismus.v Zijn kop is relatief groot met donkere ogen en de snavelbasis is relatief breed. Het achtereind lijkt slank door de lange vleugels en staart. De bovenzijde is bruin en de onderzijde lichtgrijs. Hij is fijngestreept op kruin en borst. Het juveniel is opvallend gevlekt op de bovenzijde.

Met zijn 14 cm is hij groter dan de bonte vliegenvanger. Zijn spanwijdte bedraagt 23 tot 25 cm.

Hij weegt tussen de 13 en 19 gram.



## Leefgebied

Het is een talrijke, wijdverspreide broedvogel in open bossen, parken, tuinen, boomgaarden, boomlanen, bosranden etc. Het is een trekvogel die overwintert in zuidelijk Afrika.

## Nesten

De Grauwe vliegenvanger nestelt in nissen en halfopen hopen in bomen maar soms ook in gebouwen. Hij maakt ook gebruik van halfopen nestkasten.

## Broeden

Hij broedt in mei-juli met 1 à 2 broedsels. Per broedsel zo'n 4 tot 5 bruingestippelde, groenachtige eieren.

## Voeding

Hij eet vliegende insecten en in het najaar ook bessen.

Hij is rechtopzittend op een zitpost op de uitkijk naar voorbijvliegende insecten. Hij foerageert op vliegen, bladluizen, bijen, wespen en vlinders. Grauwe vliegenvangers vangen het liefst insecten met de hoogste opbrengst. Een hommelmot is bijvoorbeeld een grotere prooi als een vlieg, maar de angeltjes dienen verwijderd te worden. Dat kost tijd die de grauwe vliegenvanger liever besteed aan het vangen van andere insecten.

## Zang

Hij roept onopvallend hoog 'tsrie'. Zijn alarmroep is een scherpe 'iesste-(te)'. Zijn zachte zang bestaat uit een serie schrille en hoge tonen.